

01

Description

- **Bactérie:** *Listeria monocytogenes*
- **Zoonose**

02

Symptômes

Incubation:

- 2 à 3 semaines

Forme nerveuse: La + grave les animaux décèdent en 1 à 4 jours

- Hyperthermie
- Anorexie
- Prostration
- un "tourné en rond"
- troubles de l'équilibre

Forme abortive:

- Fièvre
- Diarrhée profuse
- Avortement

Forme septicémique:

- Touche les nouveau-nés principalement chez lesquels elle provoque la mort très rapidement

La listériose



03

Transmission

Contamination principale:

- **Ingestion d'ensilage de mauvaise qualité:**
 - pH supérieur à 5,5.
 - Présence de terre.
 - Tassage insuffisant.
 - Contamination plus importante en surface et en fin de silo.

Autres modes de contamination (rares):

- Voie respiratoire.
- Voie oculaire.

06

Que faire en prévention ?

- Eviter un excès d'humidité par un pré fanage et favoriser le tassement
- Le foin enrubanné doit être exempt de terre

05

Traitement

- **Traitement antibiotique** conseillé par votre vétérinaire

04

Diagnostic

- **Analyse de laboratoire** réalisées sur un écouvillon utérin ou préférentiellement sur l'avorton
- **Analyse aliment suspect**